



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

Consignes d'utilisation


Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + *Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales* Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + *Ne pas procéder à des requêtes automatisées* N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + *Rester dans la légalité* Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse <http://books.google.com>





BRANNER
GEOLOGICAL LIBRARY









DICTIONNAIRE
UNIVERSEL
D'HISTOIRE NATURELLE.

ATLAS.

TOME III

DICTIONNAIRE
UNIVERSEL
D'HISTOIRE NATURELLE

DIRIGÉ
PAR M. CHARLES D'ORBIGNY.

ATLAS.

ZOOLOGIE.

Myriapodes. Arachnides. Crustacés, Cirrhipèdes, Vers.
Mollusques et Zoophytes.

BOTANIQUE.

Plantes, Acotylédonées. Monocotylédonées
et Dicotylédonées.

.....
TOME TROISIÈME.
.....

PARIS.

CHEZ LES ÉDITEURS MM. RENARD, MARTINET ET C^{ie},
RUE ET HOTEL MIGNON, 2 (quartier de l'École-de-Médecine).

ET CHEZ
LANGLOIS ET LECLERCQ, | VICTOR MASSON,
Rue de la Harpe, 81 | Place de l'École-de-Médecine, 1.
Mêmes maisons, chez E. Michelsen, à Leipzig.

1849.

7.2.11

TABLES MÉTHODIQUES

DES PLANCHES

DU DICTIONNAIRE UNIVERSEL D'HISTOIRE NATURELLE.

ZOOLOGIE.

ARTICULÉS

(SUITE).

Classe des MYRIAPODES.

La classification suivie dans cette explication des figures de Myriapodes est celle de
MM. Walckenaër et P. Gervais.

ORDRE DES DIPLOPODES.

Tribu des GLOMÉRIDES.

N^{os} d'ordre
des
planches (1).

Pl. 1. Fig. 1. GLOMERIS MARGINÉ (*Glomeris marginata*, Oliv.). De grandeur naturelle.

1. a. La tête grossie, vue de profil.

(1) Les numéros d'ordre que portent les planches dans l'Atlas, et qui figurent ici entre deux parenthèses, doivent être considérés comme non avenus. Les nouveaux numéros placés en marge de ces colonnes indiquent l'ordre suivant lequel les planches doivent être classées par le relieur. — Voyez, à la fin de l'explication des planches du 1^{er} tome de l'Atlas, les *Tables de correspondance* entre les nouveaux numéros d'ordre et ceux qui sont gravés sur les planches.

Planches,

Tribu des **POLYDESMIDES.**

Pl. 1. Fig. 3. **POLYDÈME MEXICAIN** (*Polydesmus mexicanus*, Lucas).
deur naturelle.

3. a. La tête vue de face.

Tribu des **IULIDES.**

Pl. 1. Fig. 2. **IULE LUCIFUGE** (*Iulus lucifugus*, Gerv.). Grossi.

2. a. La grosseur naturelle. — 2. b. La tête vue de profil pour la disposition des ocelles.

ORDRE DES CHILOPODES.

Tribu des **SCOLOPENDRIDES.**

Pl. 1. Fig. 4. **SCOLOPENDRE MORDANTE** (*Scolopendra morsitans*, Lin).
grandeur naturelle.

4. a. La tête vue de profil pour montrer la disposition des ocelles.

Classe des ARACHNIDES.

La classification suivie dans cette table méthodique des planches est celle de M. Walke

ORDRE DES ARANÉIDES.

Tribu des **THÉRAPHOSES.**

1 (Pl. 1). Fig. 1. **MYGALE DE QUOY** (*Mygale Quoyi*, Walck.). Femelle.
deur naturelle.

1. a. Les mâchoires, les mandibules et les palpes de la **MYGALE CALPEIANA** (*Mygalécalpeiana*, Walck.). — b. Le céphalothorax de la même, vu de face pour montrer la disposition des yeux.

2 (Pl. 2). Fig. 1. **MYGALE AVICULAIRE** (*Mygale avicularia*, Degeer.).
grandeur naturelle.

Fig. 3. Extrémité d'un palpe montrant l'organe mâle.

Fig. 4. Ongle d'une patte vu de profil.

Fig. 2. Nid de la **MYGALE MAÇONNE** (*Mygale cæmentaria*, Walck.).

Tribu des **ARAIGNÉES.**

(Pl. 1). Fig. 2. **SCYTODE THORACIQUE** (*Scytodes thoracica*, Latr.).
gros.

2. a. La grandeur naturelle. — 2. b. Les mâchoires, les mandibules et les palpes. — 2. c. Le céphalothorax vu de face pour montrer la disposition des yeux.

Planches.

ORDRE DES SCORPIONIDES.

Famille des **Scorpions**.

3 (Pl. 3). Fig. 1. SCORPION AFRICAÎN (*Scorpio (Buthus) afer*, Lin.). De grandeur naturelle.

a. La disposition des yeux. — *b.* Le corps vu en dessous pour montrer la disposition des peignes et des ouvertures stigmatiformes. — *c.* Un tarse vu de profil. — *d.* L'aiguillon vu de profil. — *e.* Extrémité de l'aiguillon pour montrer les deux ouvertures qui donnent passage à la liqueur vénéneuse.

Classe des CRUSTACÉS.

La classification suivie dans cette explication des planches est celle de M. Milne Edwards.

ORDRE DES DÉCAPODES BRACHYURES.

Famille des **Clyclométopes**.

Tribu des PORTUNIENS.

1 (Pl. 2). LUPÉE PÉLAGIQUE (*Lupa pelagica*, Lin.).

Famille des **Ptérygures**.

Tribu des PAGURIENS.

2 (Pl. 4). BIRGUE LARRON, OU VOLEUR (*Birgus latro*, Herbst).

Famille des **Astaciens**.

3 (Pl. 3). HOMARD COMMUN (*Homarus vulgaris*, Edw.).

Famille des **Palémontiens**.

4 (Pl. 1). PALÉMON ORNÉ (*Palemon ornatus*, Oliv.).

ORDRE DES STOMAPODES.

Famille des **Unieuirassés**.

Tribu des SQUILLIENS.

5 (Pl. 5). SQUILLE MACULÉE (*Squilla maculata*, Lamk.).

Classe des CIRRHIPÈDES ⁽¹⁾.

Planches.

Pl. 1. Fig. 1. ANATIFE LISSE (*Anatifa lævis*, Lamk.) — *a*. Pédic
b. Valves. — *c*. Manteau. — *f*. Cirrhes.

Fig. 2. — *ff*. Cirrhes articulés. — *u*. Prolongement caudal ou
cidiforme.

Fig. 3. — *a, a, a*. Granulations blanches composant l'appareil
teur mâle. — *b*. Tronc commun ou tube excréteur c
tissent les ramifications de l'appareil mâle. — *f, f*,
articulés. — *u*. Prolongement caudal ou proboscifidif

Fig. 4. TRITON ROUGE. — *a, a*. Ovaire. — *b, b*. Seconde m
tapissant l'intérieur des valves. — *f*. Cirrhes artic
g, g, g, g, g', g'. la seconde membrane *b* se recour
elle-même à la manière des séreuses. — *j, j*. Trois
veloppe, renfermant le corps de l'animal.

Fig. A. — Matières granuleuses de l'ovaire disposées en flocons.

Fig. 5. — 2, 2,... Série de renflements ganglionnaires disposés pa
et ensemble du système nerveux.

Fig. B. — Les œufs.

Fig. 6. — *b*. Valves. — *f, f*. Cirrhes articulés.

Fig. C. — Pièces de la bouche.

Fig. D. — Membrane presque cornée qui tapisse l'intérieur d
phage et s'évase en forme de cloche dans l'estomac.

Fig. 7. — Disposition des pieds sur chaque segment. — *f, f*,
articulés. — *u*. Prolongement proboscifidiforme.

Fig. 8. — *d*. Estomac. — *d'*. Appendice communiquant avec
stomacale. — *t, t*. Intestin. — *x*. Prolongement pr
forme.

Fig. 9. — *d*. Estomac. — *d'*. Appendice communiquant avec
stomacale. — *d''*. Lacunes aréolaires de l'intérieur
tomac où s'enchâssent les dentelures du tube *t, t*.

VERS.

Classe des ANNÉLIDES.

(Planche unique non numérotée). Fig. 1. EUMOLPE PEINTE (*Eumolpe picta*)
1 *b*. Grandeur naturelle.

Fig. 2. SYLLIS TACHETÉE (*Syllis maculata*, Ed.).
2 *b*. Grandeur naturelle.

(1) Voyez la note qui accompagne l'article CIRRHIPÈDES.

Planches.

- Fig. 3. SERPULE CONTOURNÉE (*Serpula contortuplicata*, Lamk.).
Fig. 4. SPIRORBE NAUTILOÏDE (*Spirorbis nautiloides*, L.).
4 b. Portion de Fucus chargée de Spirorbes de grandeur naturelle.
Fig. 5. CLEPSINE SEXOCULÉE (*Clepsine sexoculata*, Sav.).
-

Classe des TURBELLARIÉS.

- Fig. 6. ÉOLIDICÈRE DE BROCCHI (*Eolidiceros Brocchii*, Riss.).
6 b. Grandeur naturelle.
-

Classe des HELMINTHES.

- Fig. 7. DISTOME LANCÉOLÉ (*Distomum lanceolatum*, Melhis).
7 b. Grandeur naturelle.
Fig. 8. POLYSTOME DES GRENOUILLES (*Polystomum integerrimum*, Rud.).
8 b. Grandeur naturelle.
-

EMBRANCHEMENT DES MOLLUSQUES.

CLASSE DES CÉPHALOPODES.

- 1 (Pl. 1). Fig. 1. HISTIOTEUTHIS DE BONELLI (*Histioteuthis Bonelliana*, A.d'Orb.).
1. a et b. Mandibules ou armure de la bouche.
Fig. 2. POULPE COMMUN (*Octopus vulgaris*, Lamk.).

CLASSE DES GASTÉROPODES.

La classification suivie est celle de M. Deshayes.

Ordre des HERMAPHRODITES.

Sous-ordre des **Cirrhobranches.**

Famille des **DENTALES.**

- 2 (Pl. 13). Fig. 7. DENTALE ÉLÉPHANTINE (*Dentalium elephantinum*, Martini).

Planches.

Sous-ordre des **Cyclobranches**.

Famille des **POLYPLAXIPHORES**.

Fig. 8. OSCABRION ÉCAILLEUX (*Chiton squamosus*, Lin.

Famille des **PATELLES**.

Fig. 1, 2. PATELLE COMMUNE (*Patella vulgata*, Lin.).

Sous-ordre des **Scutibranches**.

Famille des **RIMULAIRES**.

Fig. 3, 4. FISSURELLE EN BATEAU (*Fissurella nimbosa*,

Famille des **CALYPTRACIENS**.

Fig. 6. CABOCHON BONNET HONGROIS (*Pileopsis hungari*

Fig. 5. CALYPTRÉE SCABRE (*Calyptrea equestris*, Lamk.)

Sous-ordre des **Aristébranches**.

Famille des **MACROSTOMES**.

| 3 (Pl. 11). Fig. 6, 7. HALIOTIDE RAYONNÉE (*Haliotis radiata*, Desh

Sous-ordre des **Tubulibranches**.

Famille des **TUBISPIRÉS**.

Fig. 1. VERMET D'ADANSON (*Vermetus lumbricalis*, Lam

Fig. 2. MAGILE ANTIQUE (*Magilus antiquus*, Lamk.).

Sous-ordre des **Asiphonibranches**.

Famille des **TURBINACÉS**.

Fig. 5. TURBO RUBANÉ (*Turbo petholatus*, Lin.).

Fig. 3, 4. SCALAIRE COURONNÉE (*Scalaria coronata*, Lan

Famille des **PÉRISTOMIENS**.

4 (Pl. 12). Fig. 3, 4. PALUDINE DU BENGAL (*Paludina bengalensis*,

Famille des **MÉLANIENS**.

Fig. 1, 2. MÉLANIE TRONQUÉE (*Melania atra*, Desh.).

Famille des **PLICACÉS**.

Fig. 7, 8. PYRAMIDELLE TACHETÉE (*Pyramidella maculo*

Fig. 5, 6. TORNATELLE BROCARD (*Tornatella flammea*, I

Planches.

Famille des JANTHINES.

Fig. 9, 10. JANTHINE COMMUNE (*Janthina communis*, Lamk.).

Famille des NÉRITACÉS.

5 (Pl. 10). Fig. 4, 5. NATICE FLAMMULÉE (*Natica canrena*, Lamk.).

Famille des SIGARETS.

Fig. 2, 3. SIGARET DÉPRIMÉ (*Sigaretus haliotoides*, Lamk.).

Ordre des MONOÏQUES.

Sous-ordre des **Tectibranches.**

Famille des ACÈRES.

Fig. 6, 7, 8. BULLE BANDEROLE (*Bulla Aplustre*, Lin.).

Famille des APLYSIENS.

Fig. 1. APLYSIE PONCTUÉE (*Aplysia punctata*, Cuv.).

Sous-ordre des **Pleurobranches.**

Famille des OMBRELLES.

Fig. 9. OMBRELLE DE LA MÉDITERRANÉE (*Umbrella mediterranea*, Lamk.).

Sous-ordre des **Pulmonobranches.**

Famille des COLIMACÉS.

- 6 (Pl. 19). Fig. 1, 2. HÉLICE TROCHIFORME (*Helix epistylum*, Mull.).
Fig. 3, 4. HÉLICE MACROSTOME (*Helix vittata*, Mull.).
Fig. 5, 6. HÉLICE SINUÉE (*Helix sinuata*, Mull.).
Fig. 7, 8. HÉLICE MULTICOLORE (*Helix polychroa*, Swalms.).
Fig. 9, 10. HÉLICE PYRAMIDELLE (*Helix Pyramidella*, Wagn.).
Fig. 11, 12, 13. HÉLICE DE LISTER (*Helix Listeriana*, Gray).
Fig. 14, 15, 16. HÉLICE POLYGYRE (*Helix polygyrata*, Born.).
7 (Pl. 20). Fig. 1, 2. BULIME DE MENDOR (*Bulimus Mendorensis*, Brod.).
Fig. 3, 4. BULIME BURINÉ (*Bulimus signatus*, Wagn.).
Fig. 5, 6. BULIME PUDIQUÉ (*Bulimus pudicus*, Mull.).
Fig. 7, 8. BULIME PANTAGRUEL (*Bulimus Pantagruelinus*).
Fig. 9, 10. BULIME RONGEUR (*Bulimus exesus*, Spix).
Fig. 11, 12. MAILLOT CHRYSALIDE (*Pupa Chrysalis*, Fér.).

Ordre des DIOÏQUES.

Sous-ordre des Pectinibranches.

Famille des CANALIFÈRES.

- 8 (Pl. 21). Fig. 4. CANCELLAIRE OBTUSE (*Cancellaria obtusa*, Desh.).
Fig. 3. TURBINELLE POIRE (*Turbinella pyrum*, Lamk.).
Fig. 5. FUSEAU LONGIROSTRE (*Fusus longirostris*, Desh.).
Fig. 1. NÉRINÉE TUBERCULEUSE (*Nerinæa nodosa*, Def.).
Fig. 2. CÉRITHE CHENILLE (*Cerithium Aluco*, Brug.).
Fig. 6. ROCHER PALME-DE-ROSIER (*Murex Palma-rosæ*, Lamk.).

Famille des AILÉS.

- 9 (Pl. 22). Fig. 5. ROSTELLAIRE BEC ARQUÉ (*Rostellaria curvirostris*,
Fig. 1. STROMBE VARIABLE (*Strombus variabilis*, Swains.).

Famille des POURPRES.

- Fig. 6. CASQUE ZÈBRE (*Cassis undata*, Martini).
Fig. 3. RICINULE DIGITÉE (*Ricinula digitata*, Lamk.).
Fig. 7. POURPRE PERSIQUE (*Purpura persica*, Lamk.).
Fig. 4. LICORNE LÈVRE ÉPAISSE (*Monoceros crassilabrum*,
Fig. 2. CHONCHOLÉPAS DU PÉROU (*Choncholepas peruvianus*,

Famille des BUCCINÉS.

- 10 (Pl. 23). Fig. 7. HARPE VENTRUE (*Harpa ventricosa*, Lamk.).
Fig. 1. COLOMBELLE GRANDE (*Colombella major*, Sow.).
Fig. 2, 3. BUCCIN CASQUILLON (*Buccinum arcularia*, Lin.).
Fig. 8. BUCCIN MÉLANOSTOME (*Buccinum melanostoma*, Sow.).
Fig. 5. VIS ZÉBRÉE (*Terebra strigata*, Sow.).
Fig. 6. CÔNE IMPÉRIAL (*Conus imperialis*, Lin.).

Famille des COLUMELLAIRES.

- Fig. 4. VOLUTE ONDULÉE (*Voluta undulata*, Lamk.).
11 (Pl. 24). Fig. 5. MITRE SCABRIUSCULE (*Mitra scabriuscula*, Lin.).

Famille des ENROULÉS.

- Fig. 2, 3. VOLVAIRE HYALINE (*Volvaria pallida*, Lamk.).
Fig. 6. TARIÈRE SUBULÉE (*Terebellum subulatum*, Lamk.).
Fig. 1. ANCILLAIRE BORDÉE (*Ancillaria marginata*, Lamk.).
Fig. 9. OLIVE DU PÉROU (*Oliva peruviana*, Lamk.).
Fig. 4. MARGINELLE D'ADANSON (*Marginella Adansoni*, Kie.
Fig. 7, 8. OVULE INTERMÉDIAIRE (*Orula intermedia*, Sow.).
Fig. 10. PORCELAINE BOUFFONNE (*Cypræa scurra*, Chemn.).

CLASSE DES ACÉPHALES.

La classification suivie est celle de M. Deshayes.

Sous-classe des Dimyaires.

1^{er} ORDRE. — Famille des TUBICOLÉES.

Planches.

12 (Pl. 2). Fig. 3. ARROSOIR DE JAVA (*Aspergillum javanum*, Lamk.).

Famille des PHOLADAIRES.

Fig. 5, *a* et *b*. TARET COMMUN (*Teredo navalis*, Lin.).

Fig. 4, *a* et *b*. PHOLADE DACTYLE (*Pholas dactylus*, Lin.).

Famille des SOLÉNACÉES.

Fig. 4, *a* et *b*. GLYCYMÈRE SILIQUE (*Glycymeris siliqua*, Lamk.).

Fig. 2, *a* et *b*. SOLEN SILIQUE (*Solen siliqua*, Lin.).

Famille des MYAIRES.

13 (Pl. 3). Fig. 3, *a* et *b*. MYE TRONQUÉE (*Mya truncata*, Lin.).

Famille des OSTÉODESMES.

Fig. 5, *a*, *b*, *c*. ANATINE TRONQUÉE (*Anatina truncata*, Lamk.).

Famille des MACTRACÉES.

Fig. 1, *a* et *b*. GNATHODON CUNÉIFORME (*Gnathodon cuneatum*, Gray).

Fig. 4, *a* et *b*. MACTRE MOUCHETÉE (*Mactra maculosa*, Lamk.).

Fig. 2, *a* et *b*. CRASSATELLE ROSTRÉE (*Crassatella rostrata*, Lamk.).

Famille des CYCLADÉES.

14 (Pl. 4). Fig. 7, 8, 9. CYCLADE DES RIVIÈRES (*Cyclas rivicola*, Lamk.).

Fig. 3, 4. CYRÈNE CORDIFORME (*Cyrena cordiformis*, Desh.).

Fig. 4, 2. GALATHÉE A RAYONS (*Galathea radiata*, Lamk.).

Famille des CONQUES.

Fig. 5, 6. ASTARTÉ D'ISLANDE (*Astarte islandica*, Desh.).

Famille des CARDIACÉES.

15 (Pl. 5). Fig. 1, 2. BUCARDE GÉANTE (*Cardium magnum*, Lin.).

Famille des TRIDACNÉES.

Fig. 5, 6. TRIDACNE FAÏTIÈRE (*Tridacna squamosa*, Lamk.).

Famille des CAMACÉES.

Fig. 7, 8. CANE CORNE DE DAIM (*Chama damacornis*, Lamk.).

2^e ORDRE. — Famille des ÉTHÉRIES.

Planches.

Fig. 3, 4. ÉTHÉRIE PLOMBÉE (*Etheria plumbea*, Fér.).

Sous-classe des **Monomyaires**.

1^{er} ORDRE. — Famille des PECTINIDES.

16 (Pl. 8). Fig. 1, 2. LIME ÉCAILLEUSE (*Lima squamosa*, Lam.).

Fig. 6, 7. PECTEN TIGRÉ (*Pecten tigris*, Lamk.).

Fig. 3, 4. SPONDYLE SAFRANÉ (*Spondylus crocatus*, Desh.).

2^e ORDRE. — Famille des OSTRACÉES.

17 (Pl. 9). Fig. 8, 9. ANOMIE PELURE D'OIGNON (*Anomia ephippium*, Lin.).

(Pl. 8). Fig. 5. HUITRE FEUILLE (*Ostrea folium*, Lamk.).

Sous-classe des **Brachiopodes**.

Famille des PRODUCTES.

(Pl. 9). Fig. 10. PRODUITE TREILLISSÉ (*Productus antiquatus*, Sow.).

Famille des TÉRÉBRATULES.

Fig. 5, 6. TÉRÉBRATULE LYRE (*Terebratula Lyra*, Lamk.).

Fig. 7. TÉRÉBRATULE LENTICULAIRE (*Terebratula lenticularis*, Desh.).

Fig. 11, 12. TÉRÉBRATULE DE SAY (*Terebratula Sayi*, Morton).

Famille des THÉCIDÉES.

Fig. 1, 2. THÉCIDÉE RAYONNANTE (*Thecidea radians*, Def.).

Famille des CRANIES.

Fig. 3, 4. CALCÉOLE SANDALINE (*Calceola sandalina*, Lamk.).

EMBRANCHEMENT DES ZOOPHYTES.

CLASSE DES ÉCHINODERMES.

Ordre des **Échinides**.

1 (Pl. 1). Fig. 1 et 1^a. CIDARITE IMPÉRIALE (*Cidaris imperialis*, Lamk.).

Fig. 2. OURSIN ARTICHAUT (*Echinus atratus*, Lin.).

Fig. 3. OURSIN GLOBIFORME (*Echinus globiformis*, Lamk.).

Fig. 4, 4^a et 4^b. SCUTELLE RADIÉE (*Scutella radiata*, Blainv.).

Fig. 5 SCUTELLE A CINQ TROUS (*Scutella quinquefora*, Lamk.).

Fig. 6, a-f. Piquants de diverses espèces d'Oursins.

Ordre des **Stellérides**.

Planches.

2 (Pl. 3). COMATULE DE LA MÉDITERRANÉE (*Comatula mediterranea*).

CLASSE DES ACALEPHES.

- 3 (Pl. 4). Fig. 1. PÉLAGIE NOCTILUQUE (*Pelagia noctiluca*, Péron).
Fig. 2. BÉRÉNICE ROSE (*Berenice rosea*, Esch.).
Fig. 3. BÉROÉ DE FORSKAHL (*Beroë Forskahlü*, Edw.).
Fig. 4. CLADONÈME RAYONNÉ (*Cladonema radiatum*, Duj.).

CLASSE DES POLYPES.

BRYOZOAIRES.

- 4 (Pl. 5). Fig. 1 et 1^b. FLUSTRE FOLIACÉE (*Flustra foliacea*, Lin.).

ZOANTHAIRES.

- 5 (Pl. 2). Fig. 2 et 2^a. ACTINIE ANGULEUSE (*Actinia effata*, Lin.).

ALCYONIENS.

- (Pl. 2). Fig. 1. VÉRÉTILLE CYNOMOIRE (*Veretillum cynomorium*, Lamk.).
(Pl. 5). Fig. 2 et 2^a. CORAIL ROUGE (*Corallium rubrum*, Lamk.).
Fig. 3 et 3^b. CORNULAIRE ÉLÉGANTE (*Cornularia elegans*).

HYDRAIRES.

- Fig. 4 et 4^a. SERTULAIRE NAIN (*Sertularia pumila*, Lin.).
-

BOTANIQUE.

L'ordre qui sera suivi pour l'explication qui va suivre est celui adopté par M. A. de Jussieu
article TAXONOMIE, inséré dans ce Dictionnaire,

Plantes ACOTYLÉDONÉES ou CRYPTOGRAM

DIVISION DES CELLULAIRES-ANGIOSPER

Famille des CHAMPIGNONS.

Planches.

1 (Pl. 7). BOLET COMESTIBLE (*Boletus edulis*, Bull.).

Fig. 1. Le champignon entier.

Fig. 2. Coupe longitudinale du même.

Fig. 3, 4, 5. Détails de la fructification très grossis et isolés : —
tion de tube avec des cystides et des basides. — 4.
grossie. — 5. Spores grossies.

2 (Pl. 8). BOLET GROUPÉ (*Boletus circinans*, Pers.).

Fig. 1. Le champignon entier, de grandeur naturelle.

Fig. 2. Le même, jeune, avec des gouttes lactescentes.

Fig. 3. Coupe verticale.

Fig. 4, 5, 6. Détails de la fructification isolés et grossis : —
d'une cellule chargée de basides. — 5. Baside et spor
sis. — 6. Spores très grossies.

DIVISION DES VASCULAIRES.

Famille des FOUGÈRES-POLYPODIACÉES.

3 (Pl. 16). TRICHOPTERIS ÉLEVÉ (*Trichopteris excelsa*, Presl.).

Fig. 1. Une pinnule entière, vue par la face inférieure.

Fig. 2. Base de la même grossie, pour mieux montrer la fruc
ou les sores (a), dont deux ont été enlevés (b) pour
leur situation sur une nervure.

Fig. 3. Un sore grossi.

Fig. 4. Un sporange isolé, très grossi : (a) son pédicule ; (b) son

Plantes MONOCOTYLÉDONÉES.

DIVISION DES PÉRISPERMÉES.

Section des Spadiciflores.

Famille des ARACÉES ou AROÏDÉES.

Planches.

1 (Pl. 2). CALADION A FEUILLES BICOLORES (*Caladium bicolor*).

Fig. 1. Spadice isolé, entier.

Fig. 2, 3. Pollen.

Fig. 4. Fleur mâle, montrant le connectif épais et tronqué, autour duquel s'attachent les anthères, qui sont uni-loculaires.

Fig. 5. Pistil coupé longitudinalement pour montrer les deux loges.

Fig. 6. Pistil entier.

Fig. 7. Un ovule isolé, très grossi.

Section des Homoblastées.

SUPEROVARIÉES.

Famille des LILIACÉES.

2 (Pl. 13). ALOËS A CORNES DE BÉLIER (*Aloe fruticosa*, Lamk.).

Fig. 1. Fleur entière.

Fig. 2. Fleur coupée longitudinalement pour montrer les deux rangées d'ovules.

Fig. 3. Extrémité du style et stigmate très grossis.

Fig. 4. Ovaire dont on a ouvert longitudinalement une loge, pour montrer les deux séries d'ovules.

3 (Pl. 3). TULIPE DE GESNER (*Tulipa gesneriana*, Lin.). — Diverses variétés cultivées.

4 (Pl. 12). DRAGONNIER DU BRÉSIL (*Dracana brasiliensis*, Desf.).

Fig. 1. Un rameau de l'inflorescence isolé.

Fig. 2. Fleur entière isolée.

Fig. 3. La même, coupée longitudinalement pour montrer l'insertion des étamines sur le périanthe.

Fig. 4. Coupe transversale de l'ovaire.

Fig. 5. Pistil entier, dont l'ovaire et partie du style ont été coupés longitudinalement.

INFEROVARIÉES.

Famille des BROMÉLIACÉES.

5 (Pl. 4). ÉCHMÉE DISCOLORE (*Echmea discolor*, Ad. Brong.).

Fig. 1, 2. Fleur non ouverte, vue de deux côtés différents.

Fig. 3. Coupe longitudinale de la fleur.

Planches.

- Fig. 4. Portion du périclanthe, vue par dedans, montrant deux
et deux écailles qui alternent avec celles-ci.
Fig. 5. Une étamine de profil, et, fig. 6, de face.
Fig. 7. La portion de la fleur représentée par la figure 4, vue
Fig. 8. Style et stigmates très grossis.
Fig. 9. Coupe transversale de l'ovaire, grossie.
Fig. 10. Un ovule isolé, très grossi, adulte.
Fig. 11. Diagramme de la fleur.

Famille des MUSACÉES.

- 6 (Pl. 6). BANANIER DE LA CHINE (*Musa chinensis*, Sweet).
Fig. 1. Fleur entière de grandeur naturelle, vue de côté.
Fig. 2. La même, dont on a brisé le périclanthe à sa base de ma
relever et à montrer toutes les parties de la fleur.
Fig. 3. Organes sexuels dans leur ensemble.
Fig. 4. Une étamine isolée, vue par son côté interne.
Fig. 5. Coupe transversale de l'anthère grossie.
Fig. 6. Coupe transversale de l'ovaire à ovules avortés.
Fig. 7. Diagramme de la fleur.
7 (Pl. 16). STRELITZIE DE LA REINE (*Strelitzia reginae*, Ait.).
Fig. A. Inflorescence entière.
Fig. B. Feuille.
Fig. C. Port de la plante.
Fig. D. Fleur dans laquelle on a enlevé la rangée externe du p
et fendu longitudinalement la pièce formée par la
des deux pièces latérales internes, dans le but de
nu les cinq étamines, le style et les stigmates.
Fig. E. Rangée interne du périclanthe conservée intacte, et en
les organes sexuels.
Fig. G. La troisième et petite pièce du périclanthe interne, vue
dans et par dehors.

Famille des CANNACÉES.

- 8 (Pl. 5). BALISIER GRACIEUX (*Canna speciosa*, Rosc.).
Fig. 1. Port de la plante.
Fig. 2. L'étamine et le style d'une fleur adulte.
Fig. 3. Étamine jeune, vue par sa face interne ; on a enlevé
Fig. 4. La même, vue par son dos.
Fig. 5. Coupe transversale de l'anthère.
Fig. 6. Coupe transversale du style (extrémité épaisse) et
pétaloïde de l'étamine.
Fig. 7. Coupe longitudinale de l'ovaire, grossie.
Fig. 8. Coupe transversale du même, plus grossie.
Fig. 9. Un ovule très grossi.

Famille des AMOMÉES ou ZINGIBÉRACÉES.

- 9 (Pl. 17). ALPINIE A FLEURS PENDANTES (*Alpinia nutans*, Rosc.).
Fig. 1. Bouton encore fermé.

Planches.

Fig. 2. Fleur entière épanouie.

Fig. 3. Coupe longitudinale de la fleur montrant l'anthère, dans le sillon de laquelle s'applique le style.

Fig. 4. L'anthère grossie, vue de face.

Fig. 5. Stigmate.

Section des **Aschidoblastées.**

Famille des **ORCHIDÉES.**

10 (Pl. 19). **LELIA FAUX CATTLEYA** (*Lelia Cattleioides*, A. Rich.).

Fig. A. La colonne entière.

Fig. B. Sa partie supérieure grossie et vue de face.

Fig. C. Masses polliniques.

Plantes **DICOTYLÉDONÉES.**

DIVISION DES GYMNOSPERMES.

Famille des **ABIÉTINÉES.**

1 (Pl. 29). **PIN MARITIME** (*Pinus maritima*, Lamk.).

Fig. 1. Inflorescence mâle très jeune.

Fig. 2. Inflorescence mâle adulte.

Fig. 3. Fleur mâle isolée, vue par dessous, montrant les deux fentes longitudinales qui livrent passage au pollen.

Fig. 4. La même, vue de côté.

Fig. 5. La même, vue par dessus.

Fig. 6. La même, coupée transversalement.

Fig. 7. Un grain de pollen très grossi, vu un peu de côté.

Fig. 8. Le même, vu par dessus.

Fig. 9. Deux fruits en place, appliqués contre l'écaille du cône, de grandeur naturelle.

Fig. 10. Fruit entier isolé.

Fig. 11. Fruit coupé longitudinalement, de manière à montrer l'embryon en place.

Fig. 12. Embryon entier isolé. — Le graveur a représenté à tort son extrémité racinaire nettement terminée.

Fig. 13. Coupe transversale des cotylédons montrant la division nette en deux groupes opposés des lobes, que beaucoup de botanistes ont regardés jusqu'à ce jour comme autant de cotylédons distincts. Cette disposition prouve qu'il n'y a là que deux cotylédons profondément partagés en quatre lobes chacun.

DIVISION DES ANGIOSPERMES-DICLINES.

Section des Plousianthées.

Famille des EUPHORBIACÉES.

Planches.

2 (Pl. 13). EUPHORBE BRILLANTE (*Euphorbia splendens*, Boj.).

Fig. 1. Branche fleurie, de grandeur naturelle.

Fig. 2. Une inflorescence entière, vue de côté.

Fig. 3. La même, vue par dessus.

Fig. 4. Une fleur mâle isolée, vue de côté, avec une bractée laciniée.

Fig. 5. La même, vue par le dos et sans bractée.

Fig. 6. Coupe longitudinale d'une inflorescence montrant au centre la fleur femelle entourée de fleurs mâles, et de petites bractées laciniées entremêlées à celles-ci.

Fig. 7. Inflorescence jeune dont on a enlevé les deux grandes bractées rouges.

Fig. 8. Fleur femelle entière, très grossie.

Fig. 9. Coupe transversale de l'ovaire de la même.

Famille des BÉGONIACÉES.

3 (Pl. 25). BEGONIA INCARNAT (*Begonia incarnata*, Otto et Link).

Fig. 1. Fleur mâle, vue de côté.

Fig. 2. Pistil entier de la fleur femelle.

Fig. 3. Le même, vu par dessus.

Fig. 4. Anthère entière encore fermée.

Fig. 5. Anthère ouverte.

Fig. 6. Deux grains de pollen sous deux positions différentes, grossis de 425 diamètres.

Fig. 7. Style et stigmates.

Fig. 8. Coupe transversale de l'ovaire, grossie.

Fig. 9. Ovule isolé, grossi de 90 diamètres.

DIVISION DES APÉTALES.

Section des Gynandrées.

Famille des ARISTOLOCHIÉES.

4 (Pl. 1). ARISTOLOCHE SIPHON (*Aristolochia siphon*, Lhérit.).

Fig. 1. Diagramme de la fleur.

Fig. 2. Périclanthe fermé montrant sa préfloraison.

Fig. 3. Coupe longitudinale de la fleur épanouie.

Fig. 4. Organes sexuels grossis : *a*. Anthères gynandres. — *b*. Stigmates. — *c*. Ovaire.

Planches.

- Fig. 5. Pollen.
 Fig. 6. Coupe transversale de l'ovaire : *a*. Portion cellulaire des parois. — *b*. Faisceaux vasculaires. — *c*. Ovules unisériés.
 Fig. 7. Un ovule très grossi : *a*. Raphé. — *b*. Primine. — *c*. Secondine.
 Fig. 8. Fruit.
 Fig. 9. Graine vue de côté : *a*. Funicule. — *b*. Caroncule formée par une dilatation du raphé.
 Fig. 10. La graine, dont on a enlevé la caroncule, et accompagnée de deux lambeaux de l'endocarpe *a*.
 Fig. 11. Coupe transversale de la graine.
 Fig. 12. Coupe longitudinale de la graine pour montrer l'embryon en place.
 Fig. 13. Embryon isolé très grossi.
 Fig. 14. Fragment d'une coupe transversale de la tige de l'*Aristolochia sipho*, Lhérit.
 Fig. 15. Fragment d'une coupe transversale de la tige de l'*Aristolochia clematitis*, Lin.

Section des **Apétales-Cyclopermées.**

Famille des **BASELLACÉES** (démembrée des **CHÉNOPODÉES**).

- 5 (Pl. 20). **BASELLE ROUGE** (*Basella rubra*, Lin.).
 Fig. 1. Un lobe du périlanthe avec l'étamine opposée non ouverte.
 Fig. 2. Étamine non ouverte, vue par sa face externe.
 Fig. 3. Pistil entier.
 Fig. 4. Coupe longitudinale de l'ovaire.
 Fig. 5. Coupe transversale de l'ovaire.
 Fig. 6. L'ovule dans sa position naturelle.
 Fig. 7. Fruit entier de grosseur naturelle, vu par dessus, enveloppé par le périlanthe accru et devenu succulent.
 Fig. 8. Coupe transversale du même.
 Fig. 9. L'embryon spiral isolé, vu de côté.
 Fig. 10. Le même embryon vu vers son extrémité radiculaire.

DIVISION DES POLYPÉTALES.

Section des **Polypétales-Cyclopermées.**

Famille des **CARYOPHYLLÉES.**

- 6 (Pl. 10). **OEILLET BARBU** (*Dianthus barbatus*, Lin.).
 Fig. 1. Fleur entière de grandeur naturelle, avec ses bractées.
 Fig. 2. Pétale isolé.

Planches.

- Fig. 3. Pistil entier. On a fendu longitudinalement et r
le calice pour montrer le gynophore et la bas
coupés.
Fig. 4. Coupe longitudinale de l'ovaire.
Fig. 5. Coupe transversale de l'ovaire adulte, dans leq
sons ont cessé d'exister.
Fig. 6. Coupe transversale d'un ovaire jeune, et dans leq
cloisons existent encore.
Fig. 7. Ovule entier, très grossi.
Fig. 8. Capsule entière entourée par le calice et les bract
Fig. 9. La même, dénudée, le calice ayant été rabattu.
Fig. 10. Coupe longitudinale de la même.
Fig. 11. Graine entière, vue par son dos, triplée.
Fig. 12. Coupe longitudinale de la graine, montrant l'em
rement arqué.
Fig. 13. Embryon entier isolé, vu de côté.
Fig. 14. Embryon vu par le dos d'un cotylédon.

7 (Pl. 8). OEILLET DES FLEURISTES (*Dianthus Caryophyllus*, Lin.)

Sous-Division des POLYPÉTALES-HYPOG

Section des **Hypogynes-Axospermées.**

Famille des ANONACÉES.

8 (Pl. 2). ANONA A TROIS LOBES (*Asimina triloba*, Dun.).

- Fig. 1. Coupe longitudinale de la fleur.
Fig. 2, 3. Une anthère vue par sa face et par son dos.
Fig. 4. La même, coupée transversalement.
Fig. 5. Pollen.
Fig. 6. Un des pistils entier, et vu de côté.
Fig. 7. Le même, coupé longitudinalement.
Fig. 8. Le même, coupé transversalement.
Fig. 9. Un ovule.
Fig. 10. Fruit entier.
Fig. 11. Une baie isolée, mûre.
Fig. 12. Graine entière.
Fig. 13. Graine coupée longitudinalement pour montrer
en place et son albumen ruminé.
Fig. 14. Embryon isolé.

Famille des LINACÉES ou LINÉES.

9 (Pl. 38). LIN GLANDULEUX (*Linum glandulosum*, Moench).

- Fig. 1. Bouton et bractée.
Fig. 2. Organes sexuels d'une fleur non ouverte.
Fig. 3. Une étamine détachée, vue par sa face interne.

Planches.

- Fig. 4. Pistil entier.
- Fig. 5. Coupe transversale de l'ovaire.
- Fig. 6. Sa coupe longitudinale.
- Fig. 7. Un stigmate très grossi.
- Fig. 8. Graine vue par son dos.
- Fig. 9. Coupe longitudinale de la même, menée perpendiculairement au plan des cotylédons.
- Fig. 10. Embryon isolé.
- Fig. 11. Embryon coupé longitudinalement (ces deux figures d'après le *Linum usitatissimum*, Lin.).
- Fig. 12. Diagramme de la fleur.

Famille des MALVACÉES.

40 (Pl. 11). COTONNIER A FEUILLES DE VIGNE (*Gossypium vitifolium*, Lamk.).

- Fig. 1. Involucre entier.
- Fig. 2. Calice entier.
- Fig. 3. Fleur dans laquelle on a enlevé la partie antérieure du calice, trois pétales et la partie inférieure du tube staminal, pour montrer les relations des organes floraux.
- Fig. 4. Un pétale entier, réduit à moitié grandeur.
- Fig. 5. Une anthère grossie.
- Fig. 6. Pistil entier.
- Fig. 7. Coupe transversale de l'ovaire.
- Fig. 8. Sa coupe longitudinale.
- Fig. 9. Graine de grandeur naturelle, revêtue de ses poils qui forment le coton.
- Fig. 10. Coupe longitudinale de la graine, pour montrer ses cotylédons chiffonnés et ployés très irrégulièrement, ainsi que la couche mince d'albumen presque mucilagineux qui entoure l'embryon.
- Fig. 11. Embryon dont on a étalé et coupé transversalement les cotylédons.

Famille des BUTNÉRIACÉES.

41 (Pl. 17). ASTRAPÉE DE WALLICH (*Astrapæa Wallichii*, Lind.). — Réduit à environ un dixième; à côté est une fleur de grandeur naturelle.

- Fig. 1. Fleur dont on a enlevé les pétales.
- Fig. 2. Une anthère grossie.
- Fig. 3. Pistil entier.
- Fig. 4. Stigmate vu par dessus.
- Fig. 5. Coupe transversale de l'ovaire.
- Fig. 6. Coupe longitudinale du même.
- Fig. 7. Ovule.

Famille des TERNSTRÆMIACÉES.

42 (Pl. 23). CAMELLIA DU JAPON (*Camellia japonica*, Lin.).

- Fig. 1. Branche fleurie.

Planches.

- Fig. 2. Bouton.
- Fig. 3. Deux pétales et portion des étamines.
- Fig. 4. Anthère non ouverte, vue par sa face externe.
- Fig. 5. Par son côté interne, après que le filet a été enlevé.
- Fig. 6. Étamine vue de profil.
- Fig. 7. Pistil entier.
- Fig. 8. Coupe transversale de l'ovaire.
- Fig. 9. Fruit entier adulte.
- Fig. 10. Fruit dans lequel le péricarpe a été enlevé à moitié, le
ayant été respectées.
- Fig. 11. Coupe longitudinale d'une graine (ces trois dernière
d'après le *Botanical Magazine*, tab. 2784).

Famille des ACÉRINÉES.

13 (Pl. 24). ÉRABLE A FEUILLES D'OBIER (*Acer opulifolium*, Vill.).

- Fig. 1. Fleur entière, grossie, dont on a rabattu la corolle et
pour montrer le disque duquel sortent les étamine
- Fig. 2. Une anthère vue par sa face interne.
- Fig. 3. Pistil entier vu par sa large face.
- Fig. 4. Le même, vu par dessus.
- Fig. 5. Ovaire coupé transversalement.
- Fig. 6. Fruit.
- Fig. 7. Graine un peu avant sa maturité, dans la loge du fruit
- Fig. 8. Coupe d'une graine un peu avant sa maturité, trois
fois.
- Fig. 9. Embryon de la même, isolé et coupé longitudinalement
- Fig. 10. Embryon isolé et un peu déroulé.

Famille des AURANTIACÉES.

14 (Pl. 18). ORANGER LIMONIER (*Citrus limonium*, Risso.). — Réduit de 1

- Fig. 1. Bouton entier.
- Fig. 2. Portion d'étamine isolée.
- Fig. 3. Coupe transversale d'une anthère.
- Fig. 4. Fleur dont on n'a conservé que le calice et le pistil.
- Fig. 5. La même, dont on a enlevé la moitié du calice pour le
pistil entier et les marques de l'insertion des étamines
- Fig. 6. Coupe transversale de l'ovaire.
- Fig. 7. Coupe longitudinale du même.
- Fig. 8. Un grain de pollen à sec, grossi de 390 diamètres.
- Fig. 9. Un autre grain dans l'eau.
- Fig. 10. Coupe transversale d'une loge du fruit. Les grosses
qui renferment la pulpe ne manifestent pas nettement
l'arrangement : sur les ovaires jeunes, on voit qu'il
viennent de sortes de poils articulés qui se sont développés
sur la partie externe de la loge.
- Fig. 11. Une graine entière.
- Fig. 12. Coupe d'une graine dans laquelle on voit deux embryons

Sous-Division des POLYPÉTALES-PÉRIGYNES.

Section des Axospermées apérismées.

Famille des LÉGUMINEUSES-PAPILIONACÉES.

Planches.

15 (Pl. 30). INDIGOTIER COUCHÉ (*Indigofera procumbens*, Lin.). — Le peintre en a représenté à tort tous les rameaux dressés.

Fig. 1. L'étendard.

Fig. 2. Une aile.

Fig. 3, 4. Carène de profil et de face.

Fig. 5. Fleur dont on a enlevé la corolle.

Fig. 6. Androcée isolée et étalée.

Fig. 7. Pistil isolé.

Fig. 8. Légume de l'*Indigofera tinctoria*, Lin.

Fig. 9. Graine entière sèche.

Fig. 10. Graine entière ayant séjourné plusieurs heures dans l'eau.

Fig. 11. Son embryon, vu de côté.

Fig. 12. Le même, vu par la commissure des cotylédons; la radicule est déjetée vers un côté.

Famille des POMACÉES.

16 (Pl. 33). COGNASSIER DU JAPON (*Cydonia japonica*, Lamk.).

Fig. 1. Bouton près de s'ouvrir.

Fig. 2. Fleur épanouie.

Fig. 3. Coupe longitudinale d'une fleur qui vient de s'ouvrir et dans laquelle les styles sont encore courts.

Fig. 4. Fleur dont la corolle est déjà tombée et dont le calice s'est accru notablement.

Fig. 5, 6. Une anthère vue de face et par le dos.

Fig. 7. Pistil d'une fleur bien épanouie.

Fig. 8. Un stigmate grossi.

Fig. 9. Coupe longitudinale de l'ovaire, assez fortement grossie.

Fig. 10. Coupe transversale du même.

Fig. 11. Un ovule isolé et très grossi.

Fig. 12. Fruit réduit de moitié.

Fig. 13. Le même, coupé longitudinalement et montrant nettement la couche externe, très épaisse, qui provient de l'accroissement du tube du calice.

Fig. 14. Une graine entière de grandeur naturelle.

Fig. 15. Coupe d'une graine non mûre un peu grossie.

Fig. 16. L'embryon de la même, isolé, vu par le dos d'un cotylédon, dont on voit la nervation.

Famille des ROSACÉES.

17 (Pl. 9). ROSE A CENT FEUILLES (*Rosa centifolia*, Lin.).

Famille des **LYTHRARIÉES.**

18 (Pl. 27). CUPHÉE VERMILLONÉE (*Cuphea miniata*).

Fig. 1. Fleur entière, vue de face.

Fig. 2. Calice de profil, pour montrer la gibbosité de sa base côté supérieur.

Fig. 3. Une des anthères à filet barbu prise dans un bouton 1 centimètre, de profil.

Fig. 4. La même, vue de face.

Fig. 5. Série de onze étamines d'un bouton long de 5 millimètres, pour montrer qu'elles sont alors toutes serrées entre elles.

Fig. 6. Série des étamines d'une fleur adulte, pour montrer les déformations et les avortements qu'elles ont subis.

Fig. 7. Pistil entier, extrêmement jeune.

Fig. 10. Coupe transversale du même, pour montrer qu'il a des loges bien distinctes et presque égales.

Fig. 11. Coupe transversale de l'ovaire pris dans un bouton d'un centimètre de long.

Fig. 8. Pistil entier d'un bouton avancé, mais clos.

Fig. 12. Coupe transversale de son ovaire. On voit que les deux loges, fort minces, sont près de se rompre.

Fig. 9. Pistil adulte, vu de côté.

Fig. 13. Coupe transversale de son ovaire. On voit que les deux loges se sont rompues : on a indiqué par un petit cercle la situation de l'axe.

Famille des **ONAGRARIÉES** ou **ENOTHÉRÉES.**

19 (Pl. 4). FUCHSIA GRÈLE (*Fuchsia gracilis*, Lindl.).

Fig. 1. Coupe longitudinale de la fleur.

Fig. 2. Deux étamines avec un pétale et un lobe calicinal.

Fig. 3. Coupe transversale de l'ovaire.

Fig. 4. Stigmate.

Fig. 5, 6. Une anthère vue de deux côtés différents.

Fig. 7. Ovule.

Fig. 8 Diagramme de la fleur.

Section des **Pleurospermées.**

Famille des **PASSIFLORÉES.**

20 (Pl. 22). PASSIFLORE AILÉE (*Passiflora alata*, Alt.).

Fig. 1. Coupe longitudinale de la fleur.

Fig. 2. Coupe longitudinale de l'ovaire et de son gynophore.

Fig. 3. Stigmate vu par dessus.

Fig. 4. Coupe transversale de l'ovaire.

Fig. 5. Ovule.

Planches.

Famille des RIBÉSIIÉES.

21 (Pl. 37). GROSELLIER DORÉ (*Ribes aureum*, Pursh.).

- Fig. 1. Fleur entière, doublée.
- Fig. 2. Un pétale avec une étamine, vus par leur face interne.
- Fig. 3. Étamine vue de côté.
- Fig. 4. Coupe longitudinale de l'ovaire.
- Fig. 5. Sa coupe transversale.
- Fig. 6. Stigmate.
- Fig. 7. Fruit.
- Fig. 8. Graine grossie cinq fois.
- Fig. 9. La même, coupée longitudinalement.
- Fig. 10. Embryon isolé.
- Fig. 11. Diagramme de la fleur.

Famille des CACTÉES.

22 (Pl. 3). MAMILLAIRE A DENTS D'ÉLÉPHANT (*Mamillaria elephantidens*, Lem.).

- Fig. a. Coupe longitudinale de la fleur.
- Fig. b. Coupe transversale de l'ovaire.
- Fig. c. Graine.
- Fig. d. Germination.

Section des **AXOSPERMÉES** **PÉRISPERMÉES.**

Famille des OMBELLIFÈRES.

23 (Pl. 16). DIDISQUE BLEU (*Didiscus cœruleus*, Hook.).

- Fig. 1. Fleur grossie dont on a enlevé les deux pétales antérieurs.
- Fig. 2, 3. Une anthère vue par deux côtés différents.
- Fig. 4. Les deux styles et stigmates très grossis, pour montrer que ceux-ci sont lisses.
- Fig. 5. Tête de fruit.
- Fig. 6. Un fruit grossi; il n'est pas entièrement mûr.
- Fig. 7. Coupe transversale du même.
- Fig. 8. Graine non entièrement mûre.

Sous-Division des POLYPÉTALES-SÉMIPÉRIGYNES.

Famille des RHAMNÉES.

24 (Pl. 31). JOUBIER CULTIVÉ (*Zizyphus vulgaris*, Lamk.).

- Fig. 1. Fleur entière grossie, vue par dessus.
- Fig. 2. La même, coupée longitudinalement.
- Fig. 3. Une étamine avec le pétale auquel elle est opposée.
- Fig. 4. Anthère très grossie.
- Fig. 5. Coupe longitudinale du pistil et du disque.

Planches.

Fig. 6. Style et stigmates.

Fig. 7. Fruit dans lequel on a enlevé la moitié supérieure de
pour mettre à nu le noyau.

Fig. 8. Noyau entier dénudé.

Fig. 9, 10. Graine entière vue de deux côtés différents.

Fig. 11. Coupe transversale de la graine montrant son albumen.

Fig. 12, 13. Embryon isolé vu de deux côtés différents.

DIVISION DES MONOPÉTALES.

Sous-Division des SÉMI-MONOPÉTALÉES.

Famille des ÉRICACÉES.

25 (Pl. 23). BRUYÈRE ARDENTE (*Erica ardens*, Andr.).

Fig. 1. Fleur entière grossie.

Fig. 2. La même, dont on a enlevé la corolle et le sépale antérieur.

Fig. 3. Une étamine vue de profil.

Fig. 4. Anthère vue par sa face interne.

Fig. 5. Pistil entier.

Fig. 6. Coupe longitudinale de l'ovaire.

Fig. 7. Coupe transversale de l'ovaire.

Fig. 8. Ovule.

Fig. 9. Diagramme.

Tribu des RHODODENDRÉES ou famille des RHODORACÉES.

26 (Pl. 24). RHODODENDRON EN ARBRE (*Rhododendron arboreum*, Smith).

Fig. 1. Pied réduit au huitième.

Fig. 2. Fleur entière, de grandeur naturelle.

Fig. 3, 4. Anthère vue de face et de côté.

Fig. 5. Pistil et calice.

Fig. 6. Une loge de l'ovaire plus fortement grossie.

Fig. 7. Coupe longitudinale de l'ovaire.

Fig. 8. Coupe transversale du même.

Fig. 9. Une loge isolée, coupée transversalement et fortement

Famille des PRIMULACÉES.

27 (Pl. 49). GYROSELLE DE VIRGINIE (*Dodecatheon meadia*, Lin.). — Ré plus de moitié.

Fig. 1. Bouton.

Fig. 2. Fleur épanouie, de grandeur naturelle.

Fig. 3. Coupe longitudinale de la fleur dans laquelle on a tra
corolle.

Fig. 4. Deux étamines enlevées avec les deux divisions de la
auxquelles elles sont opposées, prises dans le bouton
avancé.

Planches.

- Fig. 5. Une étamine, vue de côté pour montrer son insertion sur la corolle.
- Fig. 6. Une étamine non ouverte, vue par sa face intérieure.
- Fig. 7. Coupe transversale de l'anthère.
- Fig. 8. Pistil entier.
- Fig. 9. Son placentaire central couvert d'ovules, isolé et doublé.

Famille des **PLUMBAGINÉES**.

28 (Pl. 13). DENTELAIRE DU CAP (*Plumbago capensis*, Thunb.).

- Fig. 1. Bouton fermé.
- Fig. 2. Étamine vue de côté.
- Fig. 3. Base des organes sexuels très grossie.
- Fig. 4. Extrémité du style et stigmates.
- Fig. 5. Ovaire isolé et dénudé.
- Fig. 6. Coupe longitudinale de l'ovaire pour montrer la position de l'ovule sur son long support, et la production qui descend du haut de la cavité ovarienne.
- Fig. 7. Ovule isolé avec son support fortement grossi.
- Fig. 8. Coupe transversale de l'ovaire.
- Fig. 9. Diagramme de la fleur.

Sous-division des EUMONOPÉTALÉES-HYPOGYNES.

Section des **Anisandrées**.

Famille des **LABIÉES**.

29 (Pl. 26). SAUGE A FLEURS LARGES (*Salvia patens*, Benth.). — Réduite de moitié.

- Fig. 1. Fleur entière, de grandeur naturelle.
- Fig. 2. Corolle entière dénudée pour montrer l'étranglement de son tube.
- Fig. 3. Calice.
- Fig. 4. Pistil et étamine montrant leur insertion sur la corolle, qui a été fendue, étalée et tronquée.
- Fig. 5, 6. Loge fertile de l'anthère prise dans un bouton long de 15 millimètres.
- Fig. 7. Partie inférieure des deux étamines montrant les filets et les deux loges stériles.
- Fig. 8. Coupe transversale de la loge fertile.
- Fig. 9. Ovaire entier sur son gros disque charnu jaune.
- Fig. 10. Stigmate jeune, grossi.
- Fig. 11. Coupe longitudinale d'une loge pour montrer l'ovule dans sa position naturelle. On a un peu exagéré l'espace qui existe autour de l'ovule.

Famille des **ACANTHACÉES**.

30 (Pl. 32). STROBILANTHE DE SABINE (*Strobilanthes sabiniana*, Nees). Réduit de moitié environ.

- Fig. 1. Fleur entière avec ses bractées, légèrement grossie.

Planches.

- Fig. 2. Corolle dont on a enlevé la partie antérieure pour les étamines et le style.
 Fig. 3. Bouton vu par dessus pour montrer la préfloraison corolle.
 Fig. 4. Calice.
 Fig. 5. Anthère vue de face.
 Fig. 6. Anthère vue de profil.
 Fig. 7. Anthère vue par le sommet.
 Fig. 8. Ovaire entier, un peu plus que triplé.
 Fig. 9. Coupe longitudinale de l'ovaire, où l'on a conservé la dans leur position naturelle. La cloison n'est com dans le bas.
 Fig. 10. Coupe transversale de l'ovaire menée vers sa partie sup
 Fig. 11. Coupe transversale de l'ovaire menée vers le bas, là la cloison.

Famille des GESNÉRACÉES.

31 (Pl. 7). GLOXINIE CAULESCENTE (*Gloxinia caulescens*, Lindl.).

- Fig. 1. Fleur entière.
 Fig. 2. Fleur dont on a enlevé la corolle.
 Fig. 3. Fleur coupée longitudinalement, et dont la corolle a été enlevée en grande partie.
 Fig. 4, 5. Anthère vue de face et de côté.
 Fig. 6. Coupe transversale de l'ovaire.
 Fig. 7. Ovule.

Famille de SCROPHULARINÉES.

32 (Pl. 36). PAULOWNIA IMPÉRIAL (*Paulownia imperialis*, Sieb. et Zucc.) au quart.

- Fig. 1. Tube de la corolle ouvert et étalé pour montrer les étamines.
 Fig. 2. Fleur dans laquelle on a enlevé la corolle et rabattu le calice afin de montrer le pistil.
 Fig. 3. Stigmate grossi.
 Fig. 4. Coupe transversale de l'ovaire.
 Fig. 5. Fragment de la membrane de l'aile de la graine, 50 diamètres.
 Fig. 6. Capsule mûre, et s'ouvrant déjà, de grosseur naturelle.
 Fig. 7. Graine mûre, grossie huit fois.
 Fig. 8. Coupe longitudinale de la graine, montrant du dehors le test prolongé en aile, le tégument interne l'albumen, l'embryon.
 Fig. 9. Coupe transversale de la graine.
 Fig. 10. Embryon isolé.

Section des Isandrées.

Famille des CONVULVULACÉES.

33 (Pl. 5). LISERON DES JARDINS (*Pharbitis hispida*, Choisy). Diverses

Planches.

Famille des ASCLÉPIADÉES.

34 (Pl. 12). STAPÉLIE PANACHÉE (*Stapelia variegata*, Lin.).

Fig. a. Coupe longitudinale de la fleur.

Fig. b, c. Détails.

Sous-division des EUMONOPÉTALÉES-PÉRIGYNES.

Famille des RUBIACÉES.

35 (Pl. 14). MANETTIA BICOLORE (*Manettia bicolor*).

Fig. 1. Fleur entière.

Fig. 2. Corolle ouverte et étalée.

Fig. 3. Coupe longitudinale d'une fleur dans laquelle on n'a conservé que la base de la corolle.

Fig. 4. Coupe transversale de l'ovaire.

Fig. 5. Coupe longitudinale d'une loge fortement grossie.

Fig. 6. Un placentaire entier chargé d'ovules.

Fig. 7, 8. Ovule vu par le dos et de profil.

Famille des GOODENIACÉES.

36 (Pl. 34). LESCHENAULTIE ÉLÉGANTE (*Leschenaultia formosa*, R. Br.).

Fig. 1. Fleur entière vue un peu par dessus et de face.

Fig. 3. Fleur entière vue de profil.

Fig. 2. Fleur entière vue par son côté inférieur fendu.

Fig. 4. Calice et organes sexuels d'une fleur épanouie.

Fig. 5. Organes sexuels d'un bouton fermé; le stigmate est encore logé sous la voûte formée par les anthères.

Fig. 6. La poche stigmatique, ou l'indusie du même bouton entièrement béante pour recevoir le pollen.

Fig. 7. Même partie de la fleur ouverte, dont les deux lèvres se sont rapprochées après l'entrée du pollen.

Fig. 9. Même partie d'une autre fleur épanouie, grossie.

Fig. 10. Même partie d'une autre fleur épanouie, grossie, vue par dessus.

Fig. 8. Anthère ouverte.

Fig. 11. Coupe verticale de l'indusie très grossie. On voit intérieurement la coupe du tissu stigmatique.

Fig. 12. Ovaire entier un peu plus que doublé.


Fig. 13. Coupe transversale du même, grossie.

Fig. 14. Grain de pollen à sec, grossi de 230 diamètres.

Famille des COMPOSÉES.


37 (Pl. 6). Diverses variétés de DABLIAS cultivés.





- CHILIGNATHES.** { 1. *Glomeris bordii*. (*Glomeris marginata*, Leach.)
 2. *Julus lucifugus*. (*Julus lucifugus*, Gerv.)
 3. *Polydesmus mexicanus*, Lucas.)
CHILOPODES. 4. *Scolopendra morsitans*. (*Scolopendra morsitans*, Lin.)





1. *Mygalé de Lucy*. (*Mygalé quoyi*, Walck.) 2. *Scytodes thomasi*. (*Scytodes thomasi*, Latr.)


2^c La même de grandeur naturelle.






1. *Mygale arcturata*. (*Mygale arcturata*, Latr.) - 2. *Œuf de la Mygale arcturata*. (*Mygale arcturata*)





1. *Scorpion africain*. *Scorpio (Rathus) Afr.* Linn.
a, b, c, d, e. *Détails du Scorpion Africain*.
Pottier. imp.





Lupus pinguis. (Lupus pinguis, Linn.)

Willm. imp.






Birgus latro (Birgus latro, Latr.)





Homard commun (*Homarus vulgaris*, Edw.) $\frac{1}{2}$ de gr. nat.





Palemon ornatus. (*Palemon ornatus*, Oliv.)






Linnaeus 1758

Fournier 1830

Squilla maculata. (*Squilla maculata*, *Linnaeus*)

Follis 1890






Martin. *Anatifa pinn.*

Deshayes.


1. *Anatifa levis* (Anatifa levis, Link.)

2-9. Anatomie des *Anatifes*.






- VERS. } 1. *Eumolpe picta* (Eumolpe picta, V.) - 1⁶ grand. nat. 2. *Syllis lachete* (Syllis lachete, K.) 2⁶ gr. nat.
 ANNÉLIDES } 3. *Serpula contortuplicata* (Serpula contortuplicata, L.) 4. *Spirorbis nautiloides* (Spirorbis nautiloides, Lam.)
 5. Portion de ficus chargée de spirorbes de grand. nat. 5. *Clepsine semcalata* (Clepsine semcalata, Lam.)
 TIRÉLLAIRES } 6. *Didymum lanceolatum* (Didymum lanceolatum, Risso.) 6⁶ grand. nat. 7. *Didymum lanceolatum* (Didymum lanceolatum, Risso.)
 HELMINTHES } 8. *Polysome des grenouilles* (Polysome integerrimum, Girard.) 8⁶ grand. nat.
 TREMATODES } 8⁶ grand. nat. 8. *Polysome des grenouilles* (Polysome integerrimum, Girard.) 8⁶ grand. nat.



1. *Nautiloides de Bonelli*. (*Nautiloides Bonelliana*, M. d'Orb.)
 CÉPHALOPODES. (*Cranchia Bonelliana*, Krass.) — 1^{re} Mandibules ou armure de la bouche.
 2. *Pulpe commune*. (*Octopus vulgaris*, Lam.)


Lamourus imp.





- GASTEROPODES. { 1. *L'ormet d'Alanson* (*Vermetis lumbicatus*, Lamk.) — 2. *Mugile antique*.
(*Magilus antiquus*, Lamk.) — 3 et 4. *Scalair coronée*. (*Scalaria coronata*, Lamk.)
5. *Turbo rubens*. (*Turbo pitholatus*, Lin.) — 6 et 7. *Halitide rayonnée*. (*Halitide radiata*, Aud.)






Monn. puz.

Fullard. sc.

1, 2. *Melania argus*. (*Melania abra*, Aub.) — 3, 4. *Paludine du Bengale*. (*Paludina
bengalensis*, Lant.) — 5, 6. *Tornatella brevis*. (*Tornatella semina*, Lant.) — 7, 8. *Pyramidella
aethiops*. (*Pyramidella maritima*, Lant.) — 9, 10. *Janthina communis*. (*Janthina communis*, Lant.)


Fullard. imp.





1. *Aplysia punctata*: (*Aplysia punctata*, Cav.) - 2. 3. *Ligartia elphium* (*Sigaretus halimoides*, Land.)
 4. 5. *Natica flammaria*: (*Natica canina* L.) - 6. 7. 8. *Bulla canaliculata*. (*Bulla aplousa*, Lin.)
 9. *Umbrella de la mediterranea*. (*Umbrella mediterranea*, Land.)






De la Roche

Fourmer

- 1, 2. *Helix nasutus*. (*Helix epistylus*, Mull.)—3, 4. *Helix murex*. (*Helix vittata*, Mull.)
 5, 6. *Helix sinuata*. (*Helix sinuata*, Mull.)—7, 8. *Helix multicolor*. (*Helix polychroa*, Sowerb.)
 9, 10. *Helix Pyramidalis*. (*Helix Pyramidalis*, Linn.)—11, 12, 13. *Helix de Lister*. (*Helix Listeriana*, Gray.)
 14, 15, 16. *Helix polygyra*. (*Helix polygyrata*, Bern.)

Colléau imp






Prêtre, pua

Fourquet

- 1, 2. *Bulime de Mender*. (*Bulimus Menderensis*, Aud.) — 3, 4. *Bulime turin*. (*Bulimus signatus*, Mign.)
 5, 6. *Bulime padique*. (*Bulimus padicus*, Muller) — 7, 8. *Bulime pantiqual*. (*Bulimus pantiqualis*)
 9, 10. *Bulime vagans*. (*Bulimus exilis*, Spix) — 11, 12. *Nautilus chrysalis*. (*Pupa Chrysalis*, Fer.)





Prace par

Legend se

1. *Nerine tuberculosa*. (*Nerina nodosa* Ag.) — 2. *Cerithium aluco*. (Ag.) — 3. *Turbinella pyrum*. (Lam.) — 4. *Cancellaria obtusa*. (Lam.) — 5. *Pisus longirostris*. (Lam.) — 6. *Nautilus palmatus*. (Lam.)





Ch. p. 100.

Lequand. u

1. *Strombus variabilis*. (Strombus variabilis, Linn.) — 2. *Conchaleptes de Kiro*. (Conchaleptes Peruviana, Linn.)
3. *Ricinus digitatus*. (Ricinus digitatus, Linn.) — 4. *Strombus linn. spinosus*. (Strombus crassidorsus, Linn.)
5. *Stropharia curvirostris*. (Stropharia curvirostris, Linn.) — 6. *Cassius undata*. (Cassius undata, Linn.)
7. *Purpura penicillata*. (Purpura penicillata, Linn.)






1. *Colymbella grande* (*Colymbella major*, Lam.) — 2, 3. *Buccina vasculosa* (*Buccinum arcularia*, Lin.)
 4. *Voluta undulata* (*Voluta undulata*, Lam.) — 5. *Terebra strigata* (Lam.) — 6. *Conus imperialis*
 (*Conus imperialis*, Lin.) — 7. *Harpa ventrosa* (*Harpa ventrosa*, Lam.) — 8. *Buccina melanostoma*
 (*Buccinum melanostoma*, Lam.)






1. *Ancillaria borbis*. (*Ancillaria marginata*, Lam.) — 2, 3. *Volvaria hyalina*. (*Volvaria pallida*, Lam.)
 4. *Marginella Adansonii*. (*Marginella Adansonii*, Lam.) — 5. *Mitra scabra*. (*Mitra scabra*, L.)
 6. *Terebellum subulatum*. (*Terebellum subulatum*, Lam.) — 7, 8. *Ovula intermedia*. (*Ovula intermedia*, Lam.)
 9. *Olivia Pessiciana*. (*Olivia Pessiciana*, Lam.) — 10. *Cypraea boffinensis*. (*Cypraea boffinensis*, Lam.)






1 a et 1 b. *Pholade dactyle*. (Pholas dactylus, Linn.) — 2 a et 2 b. *Solen solique*. (Solen solique, Linn.)
 3. *Aspergillum Javae*. (Aspergillum Javae, Linn.) — 4 a et 4 b. *Glycymeris solique*. (Glycymeris solique, Linn.)
 5 a et 5 b. *Teredo navalis*. (Teredo navalis, Linn.)







1 a et 1 b. *Gnathodon coniforme*. (*Gnathodon coniformis*, Ling.) - 2 a et 2 b. *Crassatella rostris*. (*Crassatella rostris*, L.)
 3 a et 3 b. *Mya truncata*. (*Mya truncata*, Lin.) - 4 a et 4 b. *Macra mouchetii*. (*Macra mouchetii*, Land.)
 5 a et 5 b. *Anatina truncata*. (*Anatina truncata*, Land.) - 5 c. Charnière de l'*Anatina* montrant le ligament
 et son ancrage.





1, 2. *Galathée à rayons* (*Galathea radiata*, Lamé.) = 3, 4. *Cyprine cordiforme* (*Cyprina cordiformis*, Pout.)
 5, 6. *Astarte d'Islande* (*Astarte islandica*, Pout.) = 7, 8, 9. *Cyclade des rivières* (*Cyrtas rivicola*, Lamé.)






1, 2. *Bucarde grante* (*Cardium magnum*, Linn.) 3, 4. *Ethérie plumbée* (*Ethéria plumbea*, var.)
5, 6. *Tridacne pâlée* (*Tridacna squamosa*, Linn.) 7, 8. *Chame corne de saum* (*Chama daniconus*, Linn.)





1. 2. *Lima cincta*. (Lima squamosa, Lam.) 3. 4. *Spondylus asper*. (Spondylus crocatus, Prod.)
5. *Mytilus penell*. (Ostrea folium, Lam.) 6. 7. *Pecten tigris*. (Pecten tigris, Lam.)






Centre pour

Journal de

- 1 2. *Chicorella rugosa* (Thecidea radiana, Ag.) 3 4. *Calveola sandalina* (Lam.)
 5 6. *Terrebratula lyra* (Terrebratula lyra, Lam.) 7. *Terrebratula lenticularis* (Raf.)
 8 9. *Anomia pelata* (Anomia philippina, Linn.) 10. *Productus trilineatus* (Lam.)
 11 12. *Terrebratula de Say* (Terrebratula Say, Bonn.)






ECHINODERMES.

ECHINIDES.

1. *Cidarites imperialis*. (*Cidarites imperialis*, Lam.) — 1° Le même dépouillé de ses piquants.
2. *Carsien artichaut*. (*Echinus atratus*, Lam.; *Echinometra atrata*, M.) — 3. *Carsien globiforme*. (*Echinus globiformis*, Lam.) — 4. *Scutelle radiale*. (*Scutella radia*, Almon.) — 4° La même vue en dessous. — 4° La même vue de côté. — 5. *Scutelle à cinq bras*. (*Scutella quinquebr.*, Lam.)
6. Piquant de l'*Oursin mameloné*. — 6° Piquants de divers *Oursins*.






Comatule de la Méditerranée. (Comatula Medusarum.)

1. 2. 3. La Comatule en diverses positions, au double de la grandeur nat.
4. Le Disque ventral plus grossi montrant la bouche au milieu et
l'Orifice anal en b. - 5. Une des Pinnules des bras.

ECHINODERMES.


the fact that the *Journal of the American Medical Association* has been the most influential of the medical journals in the United States, and that the *Journal of the American Medical Association* has been the most influential of the medical journals in the United States.



Plaque de

- ACALÉPHES. { 1. *Plagia noctiluque*. (*Plagia noctiluca*, Penn.) — 2. *Berenice rosea*.
(*Berenice rosea*, Lach.) — 3. *Bérœ de Férussac*. (*Berœ de Férussac*, Lach.)
4. *Cladonème rayonné*. (*Cladonema radiatum*, Dej.)





POLYPES BRUYZOAIRES. 1. • *Plustra foliacée* (Plustra foliacea, L.) - 1^b Portion de la même grasse et montrant quelques polypes épanouis.

POLYPES ALCYONAIRES. 2. • *Corail rouge* (Corallium rubrum, Lant) - 2^b Portion du même grasse.

3. • *Cornulaire élégante* (Cornularia elegans, V.) - 3^b La même grasse.

POLYPES HYDRAIRES. 4. • *Sertulaire naine* (Sertularia pumila, L.) - 4^b Portion de la même grasse.





POLYPES ALCYONIENS. 1. *Verrillia cynosuroides*. (*Verrillia cynosuroides*, Lam.)

POLYPES ZOANTHAIRES. 2. *Actinia angulosa*. (*Actinia effusa*, Lam.; *Cribrella effusa*, Lam.)

2°. La même dans l'état de contraction.


Lamoureux sculp.





CHAMPIGNONS

1 à 5. : *Bolet comestible*. (*Boletus edulis*, Bull.) grand moyen.





CHAMPIGNONS

1 à 5. *Bolet groupi*. (Boletus circinans, Pers.) de grand. nat.





AROIDEES *Caladium aputes bicolor* (*Caladium bicolor*)





LILIACÉES. • *Horned Aloe*. (*Aloe fruticosa*, L.F.) 1/20 de grand. nat.





Recherches

Flora

LILIACÉES. *Tulipe de France*. (*Tulipa Gesneriana*, L.)

Lamproloma





ISPIRAGIÆES: *Craqueiro de Brasil*. (*Dracena brasiliensis* Desf.) *En de gr. nat.*

Foll. amp.





BROMÉLIACÉES. *Echeveria discolor*. (*Echeveria discolor*, Ad. Brong.)

1/2 de grandeur naturelle.





MUSACÉES. Bananier de la Chine. (Musa sapientum, Sweet.)





MUSACÉES. *Strelitzia de la Reine*. (*Strelitzia Reginae*, Ait.)

Robt. imp.





CANNACKES. *Palistia gracilis* (Canna speciosa, Rost.)





AMOMÉES. *Alpinia à fleurs pendantes.* (Alpinia nutans. Burc.) V. de gr. nat.





ORCHIDÉES. *Lelia puer Vallleya* (*Lelia cattleyoides*. A. Rich.) 73 de gr. nat.

Pollin. imp.





7.



6.



2.



9.



1.



Pinus



4.



5.



11.



8.



10.



13.



12.

Pinus

ABIÉTINÉES. *Pin maritime*. (*Pinus maritime*, Lam.)






EUPHORBACEÆ. *Euphorbia corollata*. (*Euphorbia splendens*, Desf.)







BÉGONIACÉES. *Begonia incarnata*. (*Begonia incarnata*, Otto et Link.)


Gravé d'après nature.





ARISTOLOCHIÉES. *Aristolochia* *syriaca*. (*Aristolochia* *syriaca*, L.)





CHÉNOPODIÉS. *Basella rubra*. (*Basella rubra*, L.)






CARYOPHYLLÉES. *Œillet barba* (*Dianthus barbatus*, Linn.)




•





CARYOPHYLLÉES. Œillet des parvies. (*Dianthus caryophyllus*, Linn.)





A. tomentosa


Annona tomentosa

ANONACÉES. *Annona* à deux lobes (*Asimina triloba*, Pursh.)





Fam. des LINÉES *Lin glandulosum* (Linum glandulosum, Moench)





Fam. des MALVACÉES. *Echennier à feuilles de vigne*. (*Gossypium vitifolium*, Lam.)





BUTYRIACÉES. *Butyraria* de Malloch. (*Butyraria Mallochii*, Lindl.)





TERNSTROMIACEAE. 1. *Camellia japonica*. (*Camellia japonica*, Linn.) 3/4 de gr. nat.



BÉGONIACÉES. *Begonia incarnata*. (*Begonia incarnata*, Otto et Link.)

Grandeur naturelle.





MUSACÉES. *Strelitzia de la Reine* (Strelitzia Reginae, Ait.)

Représentation





CANNACÉES. *Balisier gracilis* (Canna speciosa, Rose)






AMOMÉES. *Alpinia à fleurs pendantes.* (*Alpinia nutans*, Rose.) *Sp. de gr. nat.*






ORCHIDÉES. *Lelia puer Vallleya* (*Lelia catleoides*. A. Rich.) 23 de gr. nat.





ARIÉTINÉES. *Pin maritime*. (*Pinus maritima*, Lam.)





EUPHORBACEÆ. *Euphorbia splendens*. (Euphorbia splendens, Desf.)






BÉGONIACÉES. *Begonia incarnata*. (*Begonia incarnata*, Olin et Link.)

Grandeur naturelle.



Figure 1





ARISTOLOCHIÉES. *Aristolochia nifon*. (*Aristolochia Sipho*, Zucc.)





CARYOPHYLLÉES. *Cliffort barba* (*Dianthus barbatus*, L.)






CARYOPHYLLÉES. *Célibet des fleuristes.* (*Dianthus caryophyllus*, Linn.)





CARYOPHYLLÉES. *Œillet des parvules.* (*Dianthus caryophyllus*, L.)





A. p. p.

Annedouche

ANONACÉES. *Annona à trois lobes* (*Asimina triloba*, *Dum.*)






Fam. des LINÉES


Lin glanduleux

(*Linum glandulosum*, Moench)





Fam. des MALVACÉES. *Cotonnier à feuilles de vigne*. (*Gossypium vitifolium*, Lam.)







BUTNÉRIACÉES. *Antigonon* de Mallick. (*Antigonon* Wallich, Lindl.)





TERYSTROEMLACÉKS. 1. *Camellia japonica* (Camellia japonica, Linn.) M. de sp. nat.






ACÉRINÉES. *Erable à feuilles d'obier.* (*Acer opulifolium*, Vill.)

Lamoureux sculp.





Fructus imm.

P. 2 and fruit

Fructus im.

ACRANTHACEÆ. *Citrus limon*. (Citrus limonum, Rose.)

Folium im.





Indigofera tinctoria

Indigofera tinctoria

LÉGUMINEUSES-PAPILIONACÉES. *Indigofera tinctoria* (Indigofera tinctoria, L.)

Indigofera tinctoria





Stamens part.

P. D. anal. first.

Female X

POMACEES. Coignassier du Japon. (Cydonia japonica, H. K.)

Lanceolata sup.





ROSACÉES.

Rose à cent feuilles. (Rosa centifolia, L.)





LYTHRARIÉES. *Euphorbia vermillena*. (*Euphorbia miniata*,)





OXAGRARIÈES. *Fuchsia gracilis*. (*Fuchsia gracilis*, Lindl.)





PASSIFLORÉES. *Passiflora alata*. (*Passiflora alata*, Ait.)

Lamarque sculp.






RIBESLACÉES. *Grosseller de Chine*. (*Ribes sanguineum*, Pursh.)
Lanceum sp.





CACTÉES. *Mammillaire à dents d'Éléphant* (*Mammillaria elephanticeps*, Lam.) 1/2 de gr. nat.





OMBELLIFÈRES. *Pedicularis* Hb. (*Didymus corymbos.* Benth.)





ERICACÉES. *Pygme ardens*. (*Erica ardens*, Andr.)

Lamoureaux sculp.





PRIMULACÉES. *Gysseille de Virginie*. (Dodecatheon Meadia, Lin.)


Del. et sculp. 1847



100



PLUMBAGINÉES. *Sentelais du Cap.* (*Plumbago capensis*, Thunb.)





LABIÉES. *Sauge à fleurs larges.* (*Salvia patens*, Benth.)








Musbot p. 101

Fleur de 10

GESNERACEES. *Gloxinia carolinensis*. (*Gloxinia carolinensis*, Lindl.)





SCROPHULARINÉES. *Paulownia imperial*. (*Paulownia imperialis*, Sieb. et Zucc.)

Lamprosema imp.





Plumbago

Saururus

CONVOLVULACÉES. *Liseris ou des prés* (*Plarbitis lupula*, (Lam.)





ASCLEPIADEES. *Stapelia paniculata*. (*Stapelia variegata*, L.)





RUBIACEÆ. • *Manettia baccata* (Manettia baccata.)





GOODENACKERS. *Leichenaulia elegans*. (*Leichenaulia ternosa*, R. Brown.)





COMPOSÉES. *Dahlia.*



Stanford University Libraries



3 6105 002 865 710

626985

